

無痛內視鏡檢查 麻醉說明書

麻醉專科醫師在檢查前會詳細評估您的疾病史及生理狀況，依個人狀況需求，來決定最適合您的麻醉方式。

- 一、靜脈注射全身麻醉會使您失去全身的痛覺與知覺。通常麻醉開始會先由鼻導管或面罩給予氧氣，然後從靜脈點滴注射麻醉藥物，以迅速使您入睡，再適量注射鎮靜藥物，來維持檢查中的麻醉深度。
 1. 為了維持呼吸道的通暢而進行之處置(如口、鼻通氣道管置入等)可能有牙齒、牙齦、嘴唇、口腔黏膜受傷或鼻流血的機會，任何假牙或鬆動之牙齒，有可能掉落或損傷，必要時會拔除，以維持氣道通暢與安全。
 2. 對於特異體質之受檢查者，麻醉可能引發惡性高熱(這是一種潛在遺傳疾病，現在醫學尚無法適當事前試驗來預測惡性高熱之發生，亦無方法來加以預防)。
 3. 由於藥物特異過敏而引致之突發性反應，病患可能會起紅疹、皮膚癢、呼吸困難、休克甚至危急生命。目前並無檢驗方法來加以預測是否會發生。
- 二、對於部份接受麻醉之受檢查者而言，均有可能發生以下之副作用及併發症。
 1. 對於已有或潛在性心臟血管系統或腦血管系統疾病之受檢查者而言(如糖尿病、高血壓、高血脂、年老或肥胖等)於檢查中或麻醉後較易引發突發性心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭或較易發生腦中風。
 2. 對於已有氣喘、上呼吸道感染、慢性肺部疾病、呼吸道疾病或長期抽菸之受檢查者，麻醉中較易有支氣管攣縮，麻醉後痰液咳清不易，可能增加肺擴張不全或肺炎之機會。
 3. 禁食時間不足，於麻醉期間時有可能導致嘔吐，因而造成吸入性肺炎，少數會危及生命。
 4. 檢查中若有緊急狀況需放置侵入性導管時，例如：中心靜脈導管、動脈導管、脊髓外腔導管等，可能會發生感染、血腫、壓迫神經血管、氣胸、血胸等併發症。
 5. 麻醉後的恢復，受檢查者有不同程度的腹脹、腹痛、噁心及嘔吐、頭暈等；極少部分發生呼吸困難、發紺、意識不清，非短期內可恢復時需轉至加護病房照護。
- 三、檢查結束後，我們將持續監控您的生命徵象，給予氧氣和保暖，經觀察三十分鐘後狀況穩定即可返回休息。
- 四、對以上說明如有疑問，請在簽立同意書前詳細詢問麻醉科醫師。

無痛鏡檢 麻醉前、中、後 注意事項

各位來賓您好！因為您即將至本院執行無痛內視鏡檢查，為減輕您的疼痛及焦慮，我們會依個人狀況需求，來決定最適合您的麻醉方式。

任何檢查不管有無麻醉都有風險，麻醉醫師會於檢查當天再次評估您的生理狀況，若不適合施行無痛腸胃鏡，會再告知您。

以下所提供的注意事項希望您務必全力配合，謝謝。

一、 麻醉前注意事項：

1. 檢查前應至少禁食八小時（包括任何固體、流質食物及開水、香煙、檳榔、口香糖等，清腸準備藥物除外），以避免在檢查麻醉中嘔吐，導致嘔吐物吸入肺內造成吸入性肺炎；若感到口渴，可以使用開水漱口或刷牙以減少不適。
2. 清除口紅、指甲油，並移除身上的首飾、金屬物品、隱形眼鏡、眼鏡、假牙等；檢查當天請避免穿著高領及緊身衣物。
3. 若本身有慢性疾病如：糖尿病、高血壓、心臟病、氣喘、肝腎疾病、過敏病史、習慣用藥等等，請先告知麻醉醫護人員。
4. 為方便收放您換下之衣物，建議自備置放袋，以利貯放。

二、 麻醉中注意事項：

進入檢查室後，先協助您更換檢查專用衣物，麻醉醫護人員會為您做麻醉前的準備，如打上點滴、心電圖及血氧濃度的監測、血壓的測量並給予氧氣使用，以確保麻醉中的安全。

三、 麻醉後注意事項：

1. 檢查後可能會有腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、嗜睡等不適症，此皆為常見症狀。
2. 檢查後會至麻醉恢復室觀察至少三十分鐘，待狀況穩定後才可返回休息。
3. 檢查後當天不建議從事精細或危險工作，例如騎車、開車、操作精密儀器設備、飲酒或簽署文件等。
4. 麻醉恢復後，需有家屬或朋友陪伴，不可自己騎車或開車返家，以確保自身安全。
5. 麻醉恢復後進食時間，建議第一次先試喝白開水約 50~100c.c.，若無不適，則可正常進食。

~ 麻醉科 關心您的健康 祝您平安 ~

※若有疑問請撥麻醉諮詢電話：(02) 2672-3456 轉 6517 ； 6516

謝謝！