

# 支氣管鏡檢查簡介

## 一、何謂支氣管鏡檢查

利用支氣管鏡(直徑約0.6公分)經由鼻腔(或口腔)進入氣管及支氣管觀察，必要時可配合內視鏡超音波檢查，或做切片及沖洗術，以診斷肺部疾病。也可用於清除支氣管內的痰液，移除呼吸道異物，或進行電燒等治療。

## 二、檢查前準備工作及注意事項

1. 填寫支氣管鏡檢查同意書，若有疑問可即時請問醫師。
2. 檢查前4小時不要吃任何東西，以免檢查時嘔吐造成吸入性肺炎。
3. 若您對任何藥物有過敏的病史，請先告訴醫師。
4. 若您在檢查前有呼吸急促或胸部不適等情況，請先主動告訴醫師。
5. 請您取下假牙，以免移位而阻塞呼吸道。
6. 檢查時須有家屬陪同檢查。



## 三、禁忌症


不合作、有出血傾向、主動脈瘤、心肺功能或身體狀況極度不佳、急性大量咳血。

## 四、檢查過程

1. 檢查前若有須要，會為您注射藥物，以減少分泌物及咳嗽。
2. 檢查前會給您吸入麻醉藥，並在咽喉噴麻醉劑，以減少作嘔及咳嗽。
3. 檢查過程若有須要，會使用氧氣及監測血氧，以了解您的狀況。
4. 檢查時請放鬆心情，並配合醫師的指令，整個過程約半小時。
5. 檢查過程中如想作嘔或咳嗽，請做深呼吸，慢慢放輕鬆。

## 五、檢查後注意事項

1. 檢查完畢後，請先在檢查室外休息三十分鐘，若無不適即可離去。
2. 檢查後一個小時內請勿進食(包括喝水)，以免噎到。如一小時後喝水不會噎到才可進食。
3. 檢查後可能會有短暫少量的血痰或咳血，可再觀察。
4. 如有(1)咳血量較大，持續不停；(2)有劇烈胸痛；(3)呼吸困難等情形，請立即到本院急診就診，住院病人請立即告知醫師或護理人員。



## 六、可能之併發症

少數人會對麻醉藥劑過敏、或引起如支氣管或喉頭痙攣(發生率小於1%)、缺氧(發生率5%-10%)、發燒、菌血症、心律不整、出血(發生率小於0.2%)、氣胸(發生率小於0.4%)、休克(發生率小於1%)。

