

## 洗牙、拔牙、胃腸鏡檢查前先吃一天抗生素

長期透析病人的抵抗力比一般人差，主要原因是身體對細菌或病毒的反應不良，而且尿毒病人的皮膚或黏膜保護層抵抗病菌能力亦較差，因此透析病人得到細菌或病毒感染的機會比一般人高。

透析病人心臟、肺等部位生病時，醫師所安排的檢查假如是一般的 X 光或超音波檢查，由於不會造成組織的傷害，所以比較安全，不需要在檢查前服用抗生素來預防細菌感染。

洗牙、拔牙、胃鏡及大腸鏡檢查，由於醫師使用器械治療牙齒或腸胃時會破壞黏膜，使表面的細菌會從受傷的黏膜進入血管內，產生菌血症，嚴重時候會造成細菌性心內膜炎，甚而危及生命。為了預防嚴重併發症，任何透析病人，若要接受洗牙、拔牙、胃鏡及大腸鏡檢查前三天要告訴透析中心醫師及護理人員，必須先服用一天的抗生素後再做檢查，以策安全！



參考資料：

馬弘桓、陳一心(2012)·肝素:血液抗凝劑的最佳選擇·腎臟與透析，24(4)。

諮詢電話02-26723456轉6052、6053

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院

護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印