



1. 實施手術的原因

白內障最常引起視力模糊、怕光、近視加深或視覺扭曲等症狀，當以上症狀已經妨礙您的日常生活時，您就應該考慮手術了。

2. 手術步驟與範圍

手術前要先將手術眼散瞳並給予局部麻醉，手術時是將眼睛內混濁的水晶体用超音波晶体乳化術吸除或囊外摘除術取出，並視病患的需要置入「人工水晶体」，以達到改善視力的目的。

3. 手術的成功率

此手術具有相當高的成功率，一般可達 95%，但是此項手術為精細之顯微鏡手術，所以有其必然之風險及可能的併發症。

4. 白內障手術的風險及術後可能的併發症

白內障手術雖可能發生併發症，但機會不高，一旦發生時需要接受藥物治療或其他手術治療。在麻醉中可能發生眼球後出血、眼球內出血、眼球破裂等；手術中可能發生眼球內出血、晶核移位等；手術後可能發生眼球內感染、角膜水腫、高眼壓、傷口裂開、視網膜水腫、視網膜剝離、人工水晶体移位、眼球內無菌性發炎、眼內殘留水晶体碎片等，尤其年輕病患在手術後可能會有老花眼或雙眼不平衡的狀況發生，須後續處理。

5. 有無其他治療方法及不實施手術可能的後果

手術目前仍是治療白內障唯一直接而且有效的方法，藥物（眼藥水）只能在白內障初期延緩它的惡化而不能治療白內障。當白內障惡化到相當程度而不接受手術，除了視力持續惡化之外，如果讓白內障放的太「熟」反而會發生青光眼等更麻煩的併發症，並且手術的困難度及併發症也大大增加。

6. 因為眼球結構精細，顯微手術要求甚高，在手術當中若有突發狀況出現，醫師會依專業知識、經驗及判斷給予適當處置。

7. 手術雖侷限於眼睛，對全身系統影響微小，但是白內障病患多為年事較高者，故無法排除於手術前後突發的狀況，如心肌梗塞、中風、胃出血……等。尤其若需全身麻醉者，可能有更高的風險。

8. 除上述說明外，因病情特殊，由手術醫師附加說明事項如下：