破傷風及疫苗注射注意事項

一、 破傷風簡介

破傷風的致病原為破傷風桿菌（Clostridium tetani）。破傷風桿菌芽胞（spore）進入人體之方式，通常是經由受土壤、塵土或動物及人類糞便污染之穿刺傷口而入。另外也有可能透過撕裂傷、燒傷及一般傷口甚或由注射受污染之藥物而引起。壞死組織有利此種厭氣性破傷風桿菌增殖。最常見之臨床初症狀為腹部僵硬或肌肉痙攣，典型的破傷風為【角弓反張】及面部表情出現「痙笑」的特徵，伴隨強烈肌肉收縮疼痛。

二、 潛伏期

典型破傷風的潛伏期約3-21天，一般為14天內。

三、 預防方法

預防破傷風的方法就是接種破傷風疫苗。

四、接種禁忌

1. 對破傷風疫苗內其他成份過敏者。過敏症狀可能包含：發癢的皮疹、呼吸困難、臉部與舌頭腫脹。
2. 急性發熱性疾病。有輕度感染，如一般感冒症狀時，不是接種禁忌，但應事先告知醫師。
3. 慢性疾病在惡化階段，應延後接種，直到病情好轉。
4. 疑似感染潛伏期(破傷風除外)。
5. 曾經發生過血小板減少，接種後會增加出血、瘀血或神經系統不適的風險。
6. 醫師應評估任何接種禁忌與感染破傷風之間的風險。

五、注射破傷風疫苗後應注意

1. 發燒、畏寒、冷感、多汗症、虛弱、全身乏力等症狀，這些症狀通常在24~48小時內緩解，有需要請返回醫院。
2. 注射部位的紅、腫、熱、痛，及注射的鄰近部位或肢體的不適。

參考資料:

1.國光生物科技股份有限公司Tetana® (Tetanus vaccine inj)藥品仿單.

2.The Pink Book-Tetanus. 2012; CDC: 291-300.

3.楊惠晴、溫振谷、李政道(2015)．破傷風疫苗回顧．疫情報導；31(8)，196-203。

諮詢電話02-26723456轉6105

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院

護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印