

## Amoxicillin + Clavulanic acid 口服液劑衛教單張

商品名	中文名
Augmentin syrup	安滅菌糖漿用粉劑

◆ **成分：**

- 1 配製後每 5 毫升含抗生素 Amoxicillin 400 毫克，每瓶含 35 毫升。

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

- 1 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

◆ **不宜使用本藥的情形(使用禁忌)：**

- 1 對本藥或  $\beta$ -lactam(Penicillins, Cephalosporins)類抗生素過敏者。
- 2 曾有過與 Augmentin 或 Penicillin 有關的黃疸/肝功能異常的病史。

◆ **配製方法：**

- 1 使用前檢查瓶蓋封口是否完整。
- 2 倒置並搖動瓶身使粉末鬆開。
- 3 加入適量冷開水至箭頭指示線底下三分之二處即可，倒置並搖動均勻。
- 4 再加水至箭頭指示線處，再次倒置並搖動。靜置 5 分鐘，以確定分散完全後供使用。若處方之藥量為 2 瓶以上時，請一瓶使用完後再泡製另外一瓶。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。

◆ **注意事項：**

1. 每次使用前請充份搖勻後再服用。
2. 服用本藥，可能會有輕微腹瀉情形發生，若症狀持續或嚴重時，請回診並告知醫師，不可自行使用止瀉藥。
3. 服用本藥前如有下列症狀請告知醫師：肝、腎疾病、苯酮尿症(phenylketonuria)。
4. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。
5. 治療期間若無醫師指示，請勿自行停藥，即使是感染症狀已消失，也應繼續服藥，直到整個療程結束，以避免抗藥性產生。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理：**服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
皮疹、蕁麻疹、搔癢、呼吸困難、胸痛、尿液變深、皮膚或眼睛顏色變黃、嚴重腹瀉、血便或其他嚴重不適	請停藥，並立即就醫
噁心、嘔吐、腹瀉、食慾喪失。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

◆ **儲存方式：**

本品應置於兒童伸手不及處。

未開封之乾粉製劑應儲存於 25°C 以下陰涼乾燥處，可存放至藥品包裝標示之有效期限。

配製後的懸浮液應冷藏(2~8°C)，可保存 7 天；若於 7 天後有未用完部份，請丟棄。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/4 修訂】

BTC00EC01-02