

Cephalexin 口服液劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cephalexin	Ulexin®	優力黴素口服懸液用顆粒	1500 毫克/60ML/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 細菌引起之感染症。

◆ **用量與用法：**

1. 服用前應先泡製完成。泡製方法：先加入約 30CC 冷開水於瓶內，將瓶蓋蓋緊，搖勻後再加冷開水至 60mL 刻度處。

2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、服藥時間或自行停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)**

1. 對本藥任一成分過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 若忘記服藥，想起時儘快服用；若想起時已接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 未泡製前，室溫陰涼乾燥處儲存；泡製後，請置於冰箱冷藏(2-8°C，可保存 7 天)。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 此藥為抗生素，治療期間若感染症狀已消失，仍需依照醫師指示繼續服用，完成整個療程才能根治，不可擅自停藥。

2. 加水後為懸浮液，服用前請先搖勻。

3. 若有對抗生素過敏或腎臟疾病，請事前告知醫師。

4. 孕婦或授乳的婦女，請事前告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

蕁麻疹、皮膚癢、吸呼困難。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/08/03 修訂】

BTC00EC03-02