

## Arimidex 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Anastrozole	Arimidex®	安美達錠	1 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療停經後婦女晚期乳癌、輔助治療停經後婦女早期侵犯性乳癌及早期乳癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 成人(包括老人)：口服一天一錠(1mg)。
3. 無法口服可泡水崩散後立即喝下。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 停經前婦女。
2. 懷孕或授乳婦。
3. 有嚴重腎損傷的病人(creatinine 廓清率低於 30 ml/min)。
4. 有中度或嚴重肝病的病人。
5. 對 Arimidex 或其所含任一個成份過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 25°C 以下室溫、避光、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 含雌激素的療法不應與 Arimidex 併用，因為會使 Arimidex 之藥理作用失效。
2. 服藥期間請勿飲酒，因酒精會增加藥物對肝臟的負擔。
3. 曾有報告顯示使用 Arimidex 會無力和嗜睡，故當這樣的症狀持續時，開車或操作機械時需小心。
4. 碰觸 Arimidex 後應洗手。
5. 若有嚴重腹瀉呼吸困難請立即就醫。
6. 請將藥品放置於孩童接觸不到的地方，避免孩童誤食或碰觸。
7. 本品含有乳糖，因此對乳糖相關成份耐受不佳者不建議使用。
8. 使用本藥品治療時會降低體內雌激素，可能因此造成骨質密度減少、血中膽固醇濃度增加。
9. 服藥期間請定期回診監測血脂肪及肝功能。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

急性過敏反應(呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂)、嚴重皮膚不良反應。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

陰道出血、骨頭肌肉痛、胃腸不適(例如口腔炎、消化不良、腹痛腹瀉、噁心、食慾降低等)。

關節炎、關節痛、陰道出血、背痛、噁心、無力、頭痛、呼吸困難、皮膚疹、週邊水腫。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/07/27 修訂】

BTC00ED05-02