

Leflunomide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Leflunomide	Arheuma®	雅努麻錠	20 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療成人類風濕性或乾癱性關節炎。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 無法吞服可將藥品磨粉後立即使用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其所含任一個賦形劑過敏者。
 2. 肝功能不全病人。
 3. 重度免疫系統功能缺乏之病患，如 AIDS。
 4. 懷孕婦女，開始用 Arheuma 治療之前應排除懷孕的可能。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 請儲存於 25°C 以下室溫、避光、乾燥處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將藥品送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 男性病人應注意本藥品有可能導致男性-引起的胎兒毒性，故男性病患在服藥期間亦應使用有效的避孕方法。
 2. 服用 Arheuma 治療的婦女不可以授乳。
 3. 男性或女性病人欲生育應先告知醫師，並停用本藥，進行藥物排除步驟。
 4. 服用本藥品應喝足量的水，並定期檢查肝功能。
 5. 服藥期間應避免喝酒。
 6. 治療期間因免疫力降低，不建議施打活性減毒疫苗(如卡介苗、水痘疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)
 7. 服用本藥後若有眩暈發生，請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作。
 8. 本藥可能會使血壓升高，應定期監測血壓。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
黃疸(皮膚變黃或黃褐色、眼白的部位呈現黃色)、急性過敏反應(呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂)、嚴重皮膚不良反應(口腔/黏膜潰爛、表皮脫落、眼睛癢、水泡)、感染(發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難)。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
血壓輕微上升、腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、肝功能指數上升、頭痛、暈眩、肌腱及韌鞘發炎、落髮增加、濕疹、皮膚乾燥、發癢、白血球減少症、週邊神經異常(四肢麻、刺痛、灼熱感)。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/07/28 修訂】

BTC00ED07-02