

Glivec 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Imatinib	Glivec®	基利克膜衣錠	100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
慢性骨髓性白血病；惡性胃腸道基質瘤。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 請配合一杯水於餐中服用。
 3. 無法吞服膜衣錠之病人，可將錠劑泡在一大杯水或蘋果汁中服用。可將所需服用的劑量的錠劑泡在適當體積之液體中(100 毫克之錠劑泡於大約 50 毫升之液體中)並以湯匙攪拌。懸浮液應在錠劑崩解後立即服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對本藥或其所含任一賦形劑過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將藥品送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後可能會發生頭昏、視線模糊、嗜睡的情形。盡量避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 2. 曾有服用本藥的婦女發生自然流產及嬰兒先天性異常之通報，因此服用本藥期間及停藥後 14 天內應避孕。
 3. 本藥對嬰兒可能造成的影響不明，服藥期間或停藥後一個月內不應授乳。
 4. 服藥期間應避免吃葡萄柚或喝葡萄柚汁，以免增加藥物副作用發生。
 5. 本藥可能會引起水腫的副作用，服藥期間應定期量測體重，要特別注意體重是否超乎預期地增加，尤其是有心臟疾病或心衰竭危險因子的人。
 6. 治療期間可能發生 B 型肝炎再活化，在使用此藥之前應先檢測是否為 B 型肝炎病毒慢性帶原者。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
腸胃出血、急性過敏反應(呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂)、嚴重皮膚不良反應(口腔/黏膜潰爛、表皮脫落、眼睛癢、水泡)、肝功能異常(腸胃不適、腹脹、茶色尿、黃疸)、心衰竭(呼吸困難、心跳過快、喘、水腫)。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
輕微的噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭痛、疲勞、肌肉痛、肌肉痙攣、皮疹、表皮水腫、潮紅、體液蓄積、體重增加、嗜中性白血球減少、血小板減少或貧血。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/8/10 修訂】

BTC00ED08-02