

Capecitabine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Xeloda	Capecitabine	截瘤達錠	500 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效或用法，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)用於治療癌症，如乳癌、結腸直腸癌或胃癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 飯後 30 分鐘內與水一起吞服。
3. 無法吞服時，可將藥錠於水中崩散後立即使用。

◆ **禁忌：**

1. 對本品任一成分過敏或 fluorouracil 過敏。
2. 重度白血球減少、嗜中性白血球或血小板減少症患者。
3. 重度肝功能損害、腎功能損害(肌酸酐清除率低於 30 毫升/分鐘)患者。
4. 懷孕或哺餵母乳。
5. 正在使用 sorivudine 或其化學類似物(如 brivudine)治療。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：貯存於室溫 30°C 以下，無陽光直射、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

如忘記服用此藥，應在同一天內想起時立刻補服該次劑量，若是離下次服藥時間不足 6 小時，則可跳過該次忘記服用的劑量。切勿在同一時間或短時間內重複服用兩次劑量。

◆ **警語及注意事項：**

1. 服用本藥若發生重度噁心、嘔吐、腹瀉，應適時補充水分及電解質，避免發生脫水而引發急性腎衰竭。
2. 育齡婦女服藥期間及停藥後 6 個月應避孕。男性服藥者服藥期間及停藥後 3 個月應避孕。
3. 哺乳婦服藥期間及停藥後 2 個星期內請勿哺乳。
4. 本藥可能會造成手足症候群，輕度者手部及(或)足部會出現麻木、感覺異常/感覺遲鈍、刺痛；中重度者手部及(或)足部會出現疼痛性紅斑及腫脹、濕性脫皮、潰瘍、起水泡及重度疼痛。持續或重度的手足症候群最終可能導致指紋消失。若發生時請於回診時告知醫師以做藥品劑量的調整。
5. 由於本品的賦形劑中含有無水乳糖，因此，併有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳疾病的患者不可使用本品。
6. 本藥可能會引發暈眩、疲倦及噁心，服藥後盡量避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
7. 本藥可能引發重度皮膚反應，如史蒂文斯強生症候群與毒性表皮壞死溶解症，如有過敏反應發生請即停藥就醫。
8. 若正在服用抗凝血劑 warfarin 請先告知醫師，並密切注意凝血功能，有無不正常出血情形。
9. 二氫嘧啶去氫酶(代謝本藥的酵素)缺乏症的病人請先告知醫師，因使用本藥可能會發生嚴

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/8/10 修訂】

BTC00ED09-02

Capecitabine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Xeloda	Capecitabine	截瘤達錠	500 毫克/錠

重、危及生命或致命的不良反應。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏；胸痛、心跳過速、呼吸困難、噁心、盜汗、昏厥；腹瀉每天 4 次以上、血便、胃痛；手或腳嚴重紅腫痛、起水泡、指紋消失；嚴重噁心、嘔吐(每天 2 次以上)；感染症狀(發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛)；；手部足部腳踝腫脹、異常疲倦及昏睡；眼睛或皮膚變黃。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

掉髮、口腔炎、食慾降低、輕微腹瀉、腹痛、便秘、噁心、嘔吐、胃痛、胃炎。