

## Androcur 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cyproterone Acetate	Androcur	安得卡錠	50 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)。
  1. 男性：嚴重性慾過強、抗雄性素治療前列腺腫瘤。
  2. 女性：嚴重的男性化徵狀、青春痘、多毛症。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用。
  2. 無法口服可泡水崩散後立即使用。
- ◆ **禁忌症：**(下述僅為部分禁忌症，若您有疑慮請與我們聯絡)
  1. 對本品成分過敏者。
  2. 孕婦、授乳婦。
  3. 肝病、Dubin-Johnson 症候、Rotor 症、曾有或現有肝腫瘤。
  4. 先前懷孕有黃疸或持續搔癢病史。
  5. 現有或有腦膜瘤病史。
  7. 曾有或現有血栓栓塞。嚴重血管病變糖尿病患者。鐮形細胞貧血。
- ◆ **忘記服藥怎麼辦？**

當您發現忘了服藥時，請盡速服藥，若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次到下次服藥時間再服用當次的藥。切記不可一次服用雙倍的藥量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存於室溫陰涼乾燥處、避光保存。
  2. 避免放在孩童可以取得的場所。
- ◆ **注意事項：**
  1. 本品會引起疲倦、體力衰退而降低專注能力，服藥後應避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
  2. 女性服藥前應排除有懷孕的可能。如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
  3. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
  4. 治療期間應定期回診檢測肝功能、腎上腺皮質功能及紅血球數。
  5. 發育成熟前之兒童及青少年不能使用本品，本品對身高發育及仍然不穩定之內分泌功能可能有不良影響。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
過敏(有發疹等症狀)。肝功能受損(嘔吐、噁心、上腹部不適、無力、倦怠、皮膚或眼睛發黃、茶色尿、發癢)。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
性功能障礙、頭痛、無精打采、月經失調、體重增加、男性女乳症、乳頭觸痛、血脂異常、胃腸不適、血栓風險、貧血。