

Amiodarone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Amiodarone	Cordarone®	臟得樂錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療及預防心律不整。

◆ **用量與用法：**

1. 本藥品的藥效較慢出現，要服藥後 1-3 星期後才出現藥效，請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 每日以相同的方式，隨餐或空腹於固定時間服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或碘製品過敏者。

2. 第二、三級房室傳導障礙(AV blocker)未使用心律調整器(pacemaker)者。

3. 嚴重的竇房結(sinus node)功能不全者。

4. 懷孕婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作。

2. 若服藥期間發現懷孕，應立即停藥，並儘速就醫；哺乳婦女也應停止使用本藥。

3. 服用此藥會對日曬敏感，日曬後皮膚易呈藍灰色，當停藥後，需要數個月顏色才會消退，因此儘可能避免不必要的日曬，並做好防曬措施。

4. 服藥期間若發現有視力上的改變，如視線模糊、看到藍綠色光暈等，請回診告知您的醫師。

5. 服用本藥不可和葡萄柚汁、酒精、或含麻黃鹼的藥品併用，可能會影響藥品的藥效。

6. 有肝病，心臟病，心衰竭，甲狀腺問題，肺部疾病或呼吸問題，血壓問題，心律緩慢或腹瀉等疾病病史，請告知您的醫師。告訴醫生您是否有心臟起搏器或其他植入的心臟設備，或者是否打算進行手術。

7. 本藥可能會影響麻醉藥品的作用，若要進行手術，包括牙科手術，請告知醫師正服用本藥。

8. 若有正在服用其他類心臟用藥、抗凝血藥(如 Warfarin® 可邁丁錠)、抗癲癇藥(如 Dilantin® 癲能停膠囊)等，請告知您的醫師。

9. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

10. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

11. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。特別是
(1) 含 amiodarone 成分藥品與夏奉寧 Harvoni® (ledipasvir/sofosbuvir)併用，或與索華迪 Sovaldi® (sofosbuvir) 加上另一個直接作用抗病毒藥併用時，可能發生心跳速率減慢，有同時併用上述藥品之情形應諮詢醫療人員，經醫師評估後採取最適當之治療計畫，

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/2 修訂】

BTC00EF01-02

Amiodarone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Amiodarone	Cordarone®	臟得樂錠	200 毫克/錠

不應自行停藥。

- (2) 一旦出現心搏過緩相關徵兆及症狀，例如：近昏厥或昏厥、眩暈、全身不適、虛弱、過度疲勞、呼吸短促、胸痛、精神混亂或記憶出現問題，應立即停藥就醫。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

本藥可能引起以下問題：

- (1) 肺部問題。
- (2) 肝病。
- (3) 心臟節律問題惡化。
- (4) 視力變化。
- (5) 甲狀腺問題。

症狀	處理方法
過敏。起泡、脫皮或紅皮疹。視力模糊或其他視力變化、眼痛。胸痛、咳嗽、呼吸困難。肝功能異常(尿色深或大便白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃)。快、慢、重擊或心跳不均勻(新的或惡化的)。頭暈、頭暈或昏厥。手、手臂、腿或腳有麻木、刺痛或灼痛感。體重增加或減輕、神經質、震顫、睡眠困難、異常疲倦、脫髮。	請停藥，並立即就醫
輕度噁心、嘔吐或便秘。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師