

Amlodipine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Amlodipine besylate	Norvasc®	脈優錠	5 毫克/錠

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 治療高血壓：擴張血管，降低血壓，要長期且按時服用，才能確保療效。
2. 預防及緩解心絞痛：可增加心臟的血液及氧氣供應量。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 服用時請勿與葡萄柚汁或酒精性飲料併服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 amlodipine besylate 或本藥之任何成份過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥可能會使血壓降低太多，尤其是在初次使用或脫水時。如果感到頭暈或暈眩，請緩慢站立或坐起。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作。
2. 服用本藥請注意口腔及牙齦的變化，若有異常應請教牙醫師。
3. 服用本藥應避免與酒精、大蒜、人參、葡萄柚汁併用，可能會影響藥物的藥效。
4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、肝、腎疾病、心臟或血管疾病（包括冠狀動脈疾病，主動脈瓣狹窄），請告知醫師。
5. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。特別是本藥的藥效可能會被其它同時服用的藥物所影響，請將您目前所有正在服用的藥物，如其他類心臟血管用藥（如 Digoxin、Warfarin 等）、抗癲癇藥或成藥，告知您的醫師或藥師。
6. 請定期測量血壓、心跳速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
7. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
8. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
9. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏，頭暈、暈眩、昏厥，新的或加劇的胸痛，手、腳踝或腿部腫脹，呼吸困難、異常出汗。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、潮紅、噁心、嘔吐、虛弱無力、心悸，牙齦腫脹。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/3 修訂】

BTC00EF02-02