

Betahistine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Betahistine diHCl	Nilasen®	寧耳眩錠	16 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療梅尼爾氏症候群引起之眩暈、聽力障礙。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥品或其所含賦形劑過敏者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥後可能會發生嗜睡、異常疲倦的情形。盡量避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

2. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、肝功能異常、消化性潰瘍、氣喘、嗜鉻細胞瘤、腎上腺血管腫瘤等其他病史，請告知您的醫師。

3. 您正在服用其他抗組織胺藥物或其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

異常疲倦、腹瀉、頻尿、無食慾、噁心、麻木或灼熱感、皮疹、頭痛、嗜睡。

胃腸道不適如噁心或嘔吐：與食物併服可降低腸胃道作用。