

Carvedilol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Carvedilol	Syntrend®	心全錠	25 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 控制高血壓、治療心衰竭：要長期且按時服用，才能確保療效。
2. 治療心肌梗塞引發之左心室功能不全。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對 Carvedilol 或此藥物的任何成分過敏者。
2. 第二、三級房室傳導障礙(AV blocker)、病竇症候群(sick sinus syndrome)未使用心律調整器(pacemaker)者。
3. 嚴重肺部、支氣管方面的疾病，如氣喘、慢性支氣管疾病 (COPD)。
4. 需靜脈注射強心劑的嚴重心衰竭。
5. 嚴重肝功能不全的患者。
6. 嚴重心跳過慢(<50 次/分鐘)、嚴重低血壓(收縮壓<85mmHg)者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 由於本藥會影響血糖的變化，糖尿病患者服用本藥應特別注意並監測血糖值，若血糖控制不佳，請告知您的醫生。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病、呼吸道疾病如氣喘、氣管炎、肺氣腫病史者、糖尿病患者、或甲狀腺機能亢進者，請告知您的醫師。
4. 若有正在服用一些感冒等的成藥，請告知您的醫生或藥師。
5. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
6. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
7. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
8. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

皮膚紅疹發癢、過敏、昏厥、呼吸短促、呼吸困難、水腫、體重突然上升、胸痛、心跳變慢或不規則。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眼乾、頭暈、頭痛、喪失活力、胃痛、噁心、嘔吐、腹瀉、焦慮、鬱卒、性功能障礙。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/28 修訂】

BTC00EF10-02