

Clonidine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Clonidine	Catapres®	降保適錠	75 微克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 控制高血壓：要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥過敏者。

2. 病態竇房症候群或第 2 或 3 級房室傳導阻斷造成之重度慢速心律不整。

3. 本藥每日最大建議劑量含有 205.5 毫克的乳糖，罹患半乳糖不耐症，如半乳糖血症的病人不宜使用本藥。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩，尤其是第一次服用本藥或服藥後從坐姿、躺姿站起來時。服藥後儘量慢慢起身，可減少此現象發生。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

2. 飲酒或服用鎮靜劑，都可能會增加嗜睡的副作用，增加頭暈甚至暈倒的情形發生。應避免飲酒。服用其他藥物前，可先詢問醫師或藥師藥物有無鎮靜作用。

3. 大量流汗會造成體液流失而導致血壓降低，因此激烈運動後或處於過熱場所時應特別小心，適時補充水分。

4. 本藥可能會導致淚液減少，增加配戴隱形眼鏡的不適感。

5. 服用本藥後可能會有口乾的現象而增加蛀牙的發生，食用不含糖的口香糖或口含小塊冰塊可改善此問題，若有任何口腔的問題，可詢問牙醫師。

6. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心臟疾病、腎功能異常的病人，請告知您的醫師。

7. 請定期測量血壓及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。

8. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

9. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

呼吸困難、嚴重頭暈或昏倒、心跳減慢、針狀瞳孔、異常嚴重的疲倦和勞累。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、鎮靜、嗜睡、口乾、虛弱無力、噁心、嘔吐、食慾降低、便秘、睡眠障礙、性功能障礙。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/8/4 修訂】