

## Diltiazem 口服製劑衛教單張

| 學名           | 商品名               | 中文名    | 含量/劑型    |
|--------------|-------------------|--------|----------|
| Diltiazem    | Herbesser®        | 合必爽錠   | 30 毫克/錠  |
| Diltiazem SR | Cardizem® Unotard | 凱帝心徐放錠 | 180 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療高血壓：擴張血管，降低血壓，要長期且按時服用才能確保療效。
2. 預防及緩解心絞痛：可增加心臟的血液及氧氣供應量。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 服用時請勿與葡萄柚汁或酒精性飲料一起服用。
3. 食物會影響合必爽錠與凱帝心徐放錠的吸收，請於飯前 30 分鐘服用。
4. 凱帝心徐放錠為特殊長效劑型，請直接和水吞服，請勿剝半、嚼碎或磨粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
2. 急性心肌梗塞併有肺充血的患者。
3. 第二、三級房室傳導障礙(AV blocker)未使用心律調整器(pacemaker)者。
4. 病竇症候群(sick sinus syndrome)未使用心律調整器(pacemaker)者。
5. 收縮壓低於 90mmHg 者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 服用本藥請注意口腔及牙齦的變化，若有異常應請教牙醫師。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病病史，請告知您的醫師。
4. 本藥的藥效可能會被其它同時服用的藥物所影響，請將您目前所有正在服用的藥物，如其他類心臟血管用藥（如 Lanoxin、Warfarin 等）、抗癲癇藥或成藥，告知您的醫師或藥師。
5. 請定期測量血壓、心跳速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
6. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
7. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
8. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
皮膚紅疹、呼吸困難、四肢水腫、胸痛的頻率和嚴重度隨時間增加而增加。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
水腫、頭痛、心跳徐緩、潮紅、噁心、嘔吐、虛弱無力、肌肉痛、喉嚨痛、牙齦腫脹。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/8/20 修訂】

BTC00EF15-02