

Dipyridamole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dipyridamole	Dipyridamole [®]	待匹力達糖衣錠	25 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 預防冠狀動脈栓塞、血栓性栓塞症。
2. 慢性狹心症之治療。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥建議於空腹服用，吸收較快。但若有胃腸不適之症狀，可於飯中或飯後服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其所含賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥應盡量避免攝取當歸、大蒜、薑、人蔘、銀杏、綠茶等會影響血液凝集的藥物或食物。如無法避免，應注意有無不正常出血的情形。
2. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩、昏厥，尤其是從坐姿、躺姿站起來時。儘可能地慢慢起身，可減少此現象發生。若症狀持續，請於回診時告知醫師。服藥期間也應盡量避免開車、操作危險的機械，除非您習慣此藥對您的影響。
3. 本藥服藥過多會發生周邊血管舒張，導致血壓的下降，低血壓病患應小心使用。
4. 服藥期間，若要進行拔牙或各類手術，請告知醫師正在服用本藥。
5. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有低血壓、胸痛、心血管疾病、重症肌無力等其他病史，請告知您的醫師。
6. 若您正在服用其他抗凝血藥、抗過敏藥、止痛劑、非類固醇止痛消炎藥、抗癲癇藥(如 Depakine[®] 帝拔癲膜衣錠)等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
7. 本藥用於心絞痛之預防上，達到充分療效可能需時 2-3 個月。沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
8. 本藥服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

◆ **可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

胸痛、喉嚨腫脹、眼睛或皮膚變黃、癲癇。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腹部或胃痙攣、腹瀉、頭暈、頭痛、臉潮紅、噁心、嘔吐、虛弱。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/15 修訂】

BTC00EF16-02