

Doxazosin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Doxazosin	Doxaben [®] XL	可迅持續性藥效錠	4 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於高血壓：可使血管擴張，幫助血流順暢，降低血壓。
2. 用於前列腺肥大：可降低膀胱及輸尿管之排尿阻力，幫助排尿。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥請整粒吞服，請勿剝半、嚼碎或磨粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥或其他 quinazoline 類藥物(如 Terazosin)過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩，尤其是第一次服用本藥或服藥後從坐姿、躺姿站起來時。可在睡前服用或儘量慢慢起身，減少此現象發生。若在睡前服用，夜間起床時也要特別小心，緩慢的起身。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 請定期測量血壓及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據
3. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
4. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
5. 若已懷孕、計畫懷孕或有肝、腎疾病病史，請告知您的醫師。
6. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

胸痛、呼吸急促、突然昏倒。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

嗜睡、頭痛、疲倦、無力、心悸：在用藥數星期後即會消失。

頭昏、眩暈、噁心、胃痛：可藉由與食物併服減輕症狀。

週邊水腫。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/8/20 修訂】

BTC00EF17-02