

Pentoxifylline 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pentoxifylline	Throne®	克栓腸溶糖衣錠	100 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療末梢血管循環障礙。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 本藥為腸溶特殊劑型，請整粒配水吞服，勿撥半或磨粉。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥或其所含賦形劑、含 Xanthine 類之藥品或食品(如咖啡因、茶鹼)過敏者。

2. 近期內發生腦出血或視網膜出血的患者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服藥期間請勿抽煙，因尼古丁可能會使血管收縮，拮抗藥物作用。

2. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

3. 服藥期間應注意有無不明原因的瘀青、血便、黑便、血尿等不正常的出血情形。

4. 看診時請告知醫師或牙醫師您目前有用此藥，特別是手術或拔牙前。

5. 藥物發生作用需要數週的時間，因此服藥初期可能感覺不到藥效，不可因此而自行停藥或調整劑量，除非有醫師指示。

6. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有任何會導致出血風險的情形、肝、腎功能不全等其他病史，請告知您的醫師。

7. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方或非處方的用藥。

8. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

心悸、胸痛。

昏睡、低血壓、皮膚潮紅、痙攣發作：劑量過大，應停藥立即就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2019/7/22 修訂】

BTC00EF38-02