

Propafenone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Propafenone	Rytmonorm®	心利正膜衣錠	150 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療心律不整、心搏過速。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥品過敏者。

2. 未受控制的鬱血性心衰竭(左心室搏出率<35%)、心因性休克

3. 嚴重症狀性心搏徐緩

4. 在沒有人工心律調整器存在時出現竇結功能不全、心房傳導障礙、第二級或更嚴重房室阻斷

5. 嚴重低血壓

6. 嚴重阻塞性肺部疾病

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩、視力模糊、姿態性低血壓。應避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

2. 進行手術前(包括牙科手術)，請先告知醫師您正在服用此藥。

3. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

4. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、心臟衰竭、肝、腎功能異常、有支氣管方面疾病患者(如支氣管痙攣)患者、體內電解質不平衡患者，請告知您的醫師。

5. 若有正在服用其他類心臟用藥(如 Lanoxin)、抗凝血藥(如 Warfarin)、其他類的抗心律不整藥(如 Cordarone)等，請告知您的醫師。

6. 若有裝心律調節器之患者，需和您的醫生做更密切的監控。

7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

胸痛、呼吸困難、心跳不規律。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、虛弱無力、便秘、腹瀉、視力模糊不清、味覺改變、皮膚紅疹。