

Tocopherol Nicotinate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tocopherol Nicotinate	Juvela N [®]	高育維軟膠囊	200 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療末梢血管循環障礙。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 因軟膠囊開封後會吸收水分，而使膠囊軟化，因此請服用前才拆錫箔。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其所含賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查肝功能，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
2. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、腎功能不全、精神方面等其他病史，請告知您的醫師。
3. 服用本藥可能會增加出血的危險性，若您正在服用口服抗凝血劑(如 Warfarin)等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
4. 本藥脂溶性維生素，吸收需脂質，若您有同時服用羅氏鮮(Xenical[®])，需與本軟膠囊間隔 2 小時以上。
5. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
腹瀉、便秘、噁心、胃不舒服、胃痛、食慾不振、皮膚紅疹。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00EF47-02