

### Verapamil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Verapamil	Isoptin® SR	心舒平膜衣錠	240 毫克/錠

◆ 用途：

1. 治療高血壓：擴張血管，降低血壓，要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥為特殊長效劑型，請直接和水吞服，請勿嚼碎或磨粉。
3. 服用時請勿與葡萄柚汁或酒精性飲料併服。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥或其他同屬於鈣離子阻斷劑(Ca Channel Blocker)過敏者。
2. 嚴重左心室功能不全患者。
3. 第二、三級房室傳導障礙(AV blocker)未使用心律調整器(pacemaker)者。
4. 病竇症候群(sick sinus syndrome)未使用心律調整器(pacemaker)者。
5. 收縮壓低於 90mmHg 者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 服用本藥請注意口腔及牙齦的變化，若有異常應請教牙醫師。
3. 服用本藥應避免與酒精、大蒜、人參併用，可能會影響藥物的藥效。
4. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病病史，請告知您的醫師。
5. 本藥的藥效可能會被其它同時服用的藥物所影響，請將您目前所有正在服用的藥物，如其他類心臟血管用藥（如 Lanoxin、Warfarin 等）、抗癲癇藥或成藥，告知您的醫師或藥師。
6. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
7. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
8. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
9. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
皮膚紅疹、呼吸困難、四肢水腫、胸痛的頻率和嚴重度隨時間增加而增加。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
頭痛、眩暈、虛弱、心跳徐緩、噁心、便秘、齒齦增生。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00EF50-02