

## Ticagrelor 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ticagrelor	Brilinta®	百無凝膜衣錠	90 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
  1. 血液凝集抑制。幫助預防中風，心臟病發作和其他心臟問題。還有助於預防冠心病患者的首次心臟病發作或中風。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  2. 無法吞嚥錠劑之患者可將百無凝膜衣錠壓碎後混入水中並立即喝下，杯子應重新裝水並混合殘餘物後立即喝下。該混合藥液亦可透過鼻胃管給藥，並切記給藥後需以水將鼻胃管中殘餘藥物沖入鼻胃管。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
  2. 顱內出血病史。
  3. 活動性出血。
  4. 嚴重肝功能不全。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：貯藏在 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 服用本藥避免和小白菊、銀杏、綠茶、人參或紅花等會影響血液凝集的藥物或食物。如無法避免，應注意有無不正常出血的情形。
  2. 服藥後會較容易出血，請避免易受傷性之運動或活動，同時建議您刷牙或是用牙線時力道放輕，最好使用軟毛牙刷，刮鬍鬚時建議您使用電動刮鬍刀。
  3. 看診時請告知醫師或牙醫師您目前有用此藥，特別是手術或拔牙前，通常需要停藥 5-7 天。
  4. 服用本藥可能會出現呼吸困難，通常為輕至中度，如發生請告知醫師。在持續治療期間通常會緩解。
  5. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有肝、心律問題、肺或呼吸問題(包括哮喘或慢性肺部阻塞疾病)、或有出血史，請告知醫生。
  6. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。因可能會增加您罹患心臟病(例如:心肌梗塞)、血液凝塊或血栓的風險。若必須暫時停用，要儘快重新開始。
  7. 使用任何其他藥物(包括非處方藥，維生素和草藥產品)之前，請先諮詢您的醫師或藥師。
  8. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/21 修訂】

BTC00EF55-02

### Ticagrelor 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ticagrelor	Brilinta®	百無凝膜衣錠	90 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫

過敏反應：(瘙癢或蕁麻疹，臉或手腫脹，嘴或喉嚨腫脹或刺痛，胸悶，呼吸困難)。

血腥或黑色、柏油樣便，紅色或深棕色尿液。

快速、緩慢或劇烈的心跳。

頭暈、頭暈或昏厥。

呼吸困難、胸痛。

異常出血、瘀傷或虛弱。

嘔吐的血液或看起來像咖啡渣的物質。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

淤青、頭痛、咳嗽、頭暈、噁心、腹瀉、高血壓、血清肌酸酐上昇。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/21 修訂】

BTC00EF55-02