

Silodosin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Silodosin	Urief	優列扶膜衣錠	8 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於前列腺肥大：治療前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙。可降低膀胱及輸尿管之排尿阻力，幫助排尿。注意，本品無法用來治療高血壓。
- ◆ **用量與用法：**
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥過敏者。
 2. 嚴重肝功能不全。
 3. 嚴重腎功能不全。
 4. 禁止與強效 CYP3A4 抑制劑(如 ketoconazole、clarithromycin、itraconazole、ritonavir、cyclosporin)併用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥品副作用有姿勢性低血壓，服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩，尤其是第一次服用本藥或服藥後從坐姿、躺姿站起來時。可在睡前服用或儘量慢慢起身，減少此現象發生。若在睡前服用，夜間起床時也要特別小心，緩慢的起身。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 2. 若有服用其他降血壓製劑，請定期測量血壓及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
 3. 腎功能不全患者請小心使用。請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
 4. 手術中虹膜鬆弛症候群(Intraoperative floppy iris syndrome)在一些正服用或術前有服用甲型交感神經接受器阻斷劑(如本藥)的病患進行白內障手術時會發生。若進行白內障手術需告知眼科醫師有服用本品的情形。
 5. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
 6. 本藥不適用於女性及兒童。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏反應、胸痛、呼吸急促、突然昏倒。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
昏昏欲睡、頭痛、虛弱、無力、心悸：在用藥數星期後即會消失。
口渴、射精障礙、姿態性低血壓、鼻塞。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/07/23 修訂】