

Coralan 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ivabradine	Coralan®	康立來膜衣錠	5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於穩定型慢性心衰竭。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 食物會影響藥品吸收，請隨餐服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 嚴重肝功能不良患者不可使用。
 2. 對 Coralan 或其所含任一個成份過敏者。
 3. 懷孕婦女、授乳婦女、以及未使用適當避孕措施之育齡婦女。
 4. 治療前，靜態心跳低於 70 bpm。
 5. 心因性休克、急性心肌梗塞、不穩定狹心症、嚴重低血壓 (<90/50mmHg)、病竇症候群 (sick sinus syndrome)、竇房阻斷(Sino-atrial block)、急性或不穩定之急性心衰竭、第 3 度房室傳導阻斷(AV-block)的患者。
 6. 使用心律調整器者(心跳完全由心律調整器控制)。
 7. 與 cytochrome p450 3A4 強抑制劑，如 verapamil 或 diltiazem、azole 類抗黴菌劑、macrolide 抗生素、HIV 蛋白酶抑制劑等併用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
 2. 請將藥品放置於孩童接觸不到的地方，避免孩童誤食或碰觸。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本錠劑含有乳糖，患有罕見遺傳性半乳糖不耐症、Lapp 乳糖缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收異常的患者，不應服用本藥。
 2. 服藥期間應注意心跳變化，若心跳小於每分鐘 50 下，請停藥並盡速就醫。
 3. 本藥可能會導致血壓控制不良，高血壓病人應每日固定量測血壓。
 4. 服藥期間應避免飲用葡萄柚汁，葡萄柚汁會增加藥品副作用發生。
 5. 可能會發生光幻視(在視野中一個有限區域內出現短暫的強光)，通常是在光強度突然變化時引起，也可能出現光暈、影像分離、有顏色的亮光、多重影像等。通常在服藥後的最初 2 個月內發生，大部分的人在繼續服藥後症狀會消失。
 6. 可能會發生視力變化，若有任何未預期的衰退狀況，請告知醫師。
 7. 在駕駛或操作機器時應注意光幻視發生的可能，尤其是夜間駕駛於光線強度突然改變時。
 8. 對於先天性 QT 延長症候群或接受延長 QT 間期藥物治療之患者，應避免使用

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/08/24 修訂】

BTC00EF57-02

Coralan 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ivabradine	Coralan®	康立來膜衣錠	5 毫克/錠

ivabradine。如果併用是必須的，需要密切的心臟監測。Ivabradine 所導致的心跳減緩可能加重 QT 延長的程度，因而產生嚴重的心律不整，尤其是 Torsade de Pointes。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏反應、心跳小於每分鐘 50 下、
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
光幻視、視力模糊、心跳變慢、頭痛、頭暈、血壓控制不良。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/08/24 修訂】

BTC00EF57-02