

## Sacubitril/Valsartan 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sacubitril/Valsartan	Entresto®	健安心膜衣錠	S 49,V 51 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療慢性心臟衰竭。
- ◆ **用量與用法：**  
請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 對藥品中任何成份過敏患者。
  2. 過去使用作用於腎素-血管收縮素系統的藥物(ACEI、ARB)曾發生血管性水腫者。
  3. 併用 ACEI(禁止在使用 ACEI 的 36 小時內轉換至本藥物，或在使用本藥物的 36 小時內轉換至 ACEI)。
  4. 糖尿病患者同時併用直接腎素抑制劑(aliskiren)。
  5. 遺傳性血管性水腫。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**  
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
  2. 請將藥品放置於孩童接觸不到的地方，避免孩童誤食或碰觸。
- ◆ **注意事項：**
  1. 本藥可能會傷害未發育完全的胎兒，若發現懷孕，請立即停藥。若計畫懷孕、已懷孕、正在哺乳，請先告知醫師。
  2. 為了防止發生頭暈或昏倒，若要變換姿勢(如起身站立、下床等)時，應將速度放慢。
  3. 若您同時服用利尿劑或其他心臟類藥物，特別是作用於腎素-血管收縮素系統的藥物(ACEI 或 ARB)，請告知醫師。
  4. 如果有肝功能異常、低血壓、腎功能惡化(如:尿量減少)或心跳異常等，一定要告知醫師。
  5. 此藥物可能會有高血鉀的副作用，若您有服用保健食品、維他命時或含鉀的鹽替代品時，請告知您的醫師。高血鉀的症狀可能會有呼吸急促、虛弱、頭昏、手指或嘴唇麻木、心悸或心搏過慢。
  6. 少數病人會發生血管神經性水腫(angioedema)，輕微的症狀包括臉部或嘴唇腫脹，通常不需治療停藥即可緩解；嚴重者可能造成舌頭、聲門或喉頭腫脹，導致呼吸道阻塞，應立即停藥就醫。若有相關症狀發生時請告知醫生。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
嚴重過敏反應、嚴重血管性水腫造成呼吸困難、腎衰竭(水腫、體重突然增加、尿量變少)。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
低血壓、高血鉀、咳嗽、暈眩、腎功能惡化(如:水腫、尿量減少)

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/08/28 修訂】

BTC00EF59-02