

Pitavastatin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pitavastatin	Livalo®	力清之膜衣錠	2 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 降低膽固醇及三酸甘油酯。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本產品任何成份過敏者。

2. 活動性肝病，包括不明原因的肝轉氨酶持續上升情形。

3. 孕婦、可能懷孕的婦女或授乳婦。

4. 併用 cyclosporine 者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：儲存於 25°C，開封後請勿放置於潮濕處。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳的婦女，請告知您的醫師。

2. 若於服藥期間發現懷孕，請立刻停藥並回診。

3. 若您曾有肝病、腎臟病、糖尿病或痙攣發作，請告知您的醫師。

4. 若出現不明原因肌肉疼痛、虛弱無力時，尤其伴隨發燒或乏力者，應立即告知醫師。

5. 此類藥品可能使皮膚對日曬敏感，應避免不需要的日曬或縮短日曬時間，並做好防曬措施。

6. 自行停藥可能會導致病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

7. 非經醫師同意，請勿自行服用任何保健食品或中草藥製劑。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重全身過敏反應、肝功能異常、黃疸、肌肉疼痛、肌肉痙攣。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

乾嘔、噁心、胃部不適、頭痛、倦怠感。