

## Zonisamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Zonisamide	Zonegran®	佐能安膜衣錠	100 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 成人局部癲癇發作輔助治療。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 空腹或隨餐服用均可。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥物或磺胺類藥物過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：儲存於 30°C 以下。儲存於原包裝，避免濕氣。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥曾引發嚴重的皮疹，包括史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson syndrome)，若服用後出現不明原因的皮疹，應立即停藥就醫。

2. 自行停藥可能會導致病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

3. 使用本藥可能會感到昏昏欲睡或難以集中注意力，從事需要高度警覺性的活動時應謹慎，例如駕駛或操作機器。

4. 如果有憂鬱，焦躁不安、易怒傾向，請告知醫師。

5. 本藥品可能會引起排汗減少及體溫升高，為避免中暑，應注意水分補充。

6. 服用本藥可能會增加腎結石風險，腎結石高風險的病人(曾經形成結石、腎結石家族史、高尿鈣症)應注意多喝水。

7. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳的婦女，請告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重全身過敏反應、皮膚起水泡，潰瘍、自殺意念、代謝性酸中毒(呼吸急促、心悸、非常疲倦)、視力降低或眼痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐、便秘、消化不良。