

Phenytoin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Phenytoin	Dilantin®	癲能停膠囊	100 毫克/膠囊

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 預防及治療癲癇發作。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 請整粒吞服，勿擅自剝開膠囊；若為管灌病人，請於管灌餵食後至少 2 小時再服用藥品。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥品成分過敏的病人。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：置於 25°C 以下，避光、避濕及避熱處所。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 須與食物或牛奶併服或餐後立刻服用，以減少胃腸刺激。

2. 服用本藥時，避免喝含酒精性飲料。

3. 服用本藥可能造成嗜睡、精神不集中，應避免開車或從事其他危險性工作。

4. 服用本藥可能會降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。

5. 長期服用本藥時，可能造成維生素 D 缺乏，應適時補充。

6. 本藥與多種藥品有藥物交互作用情形，若正在服用或需使用其它藥品，請事先告知您的醫師。

7. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳婦女，或有肝、腎疾病病史請告知您的醫師。

8. 服用本藥後須定期回診監測血中濃度，以確保療效及用藥安全。

9. 請勿擅自停藥，應先與醫師討論確定後，再遵照醫師指示進行停藥，以免癲癇突發。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

皮膚起泡或脫皮、喉嚨腫脹或刺痛、意識不清、眼球震顫、皮膚或眼球變黃、癲癇持續發作。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、噁心、嘔吐、牙齦增生、毛髮增生、動作不協調。