

## Aspirin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Aspirin	Bokey®	伯基腸溶微粒膠囊	100 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 解熱、鎮痛、緩解發炎反應(如風濕性關節炎、骨關節炎、痛風)。
2. 預防心肌梗塞、心栓性栓塞症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥請整粒吞服，請勿嚼碎或磨粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品、賦形劑或其他水楊酸鹽類過敏者。
2. 對非類固醇類消炎止痛藥(NSAID) 過敏者。
3. 氣喘患者，有鼻息肉、鼻炎的患者。
4. 患有病毒感染(如流感、水痘)的<16 歲兒童和青少年。
5. 血友病或其他出血性疾病患者、糜爛性胃炎、消化性潰瘍患者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
3. 水楊酸鹽類藥品，若聞到強烈醋酸味，則不可服用，應立即丟棄。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，可能會增加胃部不適的症狀。
2. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。特別是服用本藥應盡量避免攝取當歸、大蒜、薑、人蔘、甘草、辣椒粉、銀杏、綠茶等會影響血液凝集的藥物或食物。如無法避免，應注意有無不正常出血的情形。
3. 服用本藥會造成體內葉酸和鐵的流失，因此可多補充葉酸和鐵質。
4. 服藥期間應注意有無不明原因的瘀青、血便、黑便、血尿等不正常的出血情形。
5. 未經與醫師溝通前，不得使用於年齡小於 16 歲的兒童和青少年之水痘或流行性感感冒症狀解除。因為有可能與一種罕見但嚴重之疾病-雷氏症候群 (Reye's syndrome) 相關連。若發生行為改變伴隨噁心嘔吐，請立即回診。
6. 服藥期間，若要進行拔牙或各類手術，請告知醫師或於手術前 5-7 天停用藥品。
7. 懷孕或準備懷孕、哺乳中的婦女、有血液方面疾病、心血管疾病、高血壓、肝、腎疾病、糖尿病患者、氣喘或其他呼吸道疾病或有胃出血或潰瘍等疾病病史，請告知您的醫師。
8. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
過敏。血便或黑便，血腥嘔吐物或看起來像咖啡渣的嘔吐物。胸悶，喘息。嚴重胃痛。異常出血，瘀傷。

### Aspirin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Aspirin	Bokey®	伯基腸溶微粒膠囊	100 毫克/錠

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
心灼熱或消化不良、噁心、嘔吐、耳鳴、虛弱無力。