

## Codeine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Codeine phosphate	Codeine®	磷酸可待因錠	30 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 緩解中、重度疼痛。
2. 緩解咳嗽。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其所含賦形劑過敏者。
2. 嚴重呼吸抑制者、支氣管氣喘發作者、嚴重肝障礙者、慢性肺部疾患併發心不全者、經攣狀態者、急性酒精中毒者。
3. 2 歲以下嬰幼兒不建議使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加中樞神經方面(如鎮靜)的副作用。
2. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
3. 長期服用本藥可能會有便秘的現象，多吃富含纖維素的食物及適度的運動可幫助改善。若便秘情形嚴重且持續，可於回診時告知醫師。
4. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方或非處方的用藥。
5. 沒有醫師的指示，請勿自行停藥或調整劑量。突然的停藥可能會引發戒斷症狀。
6. 2 歲以下的嬰幼兒因肝臟代謝系統發育未完全，無法將 codeine 有效代謝，因此除非醫師指示，2 歲以下嬰幼兒應避免服用本藥。若要服用，請注意可能會引發的嗜睡、運動失調、嘔吐等副作用。
7. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、有心臟血管疾病、肝、腎疾病、肺部呼吸道疾病、癩癩、精神方面有疾病、對麻醉劑成癮的患者等任何病史，請告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

藥品過量：痙攣、嚴重的頭昏眼花及虛弱、低血壓、瞳孔成細針狀、心跳心搏過慢、呼吸困難、體表冰冷。

皮膚紅疹、皮膚癢等過敏現象。

心跳變快或不規則、呼吸急促、肌肉僵硬動作無法控制、尿液顏色變深、皮膚或眼睛變黃。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問  
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/8/4 修訂】

BTC00EH05-02

### Codeine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Codeine phosphate	Codeine®	磷酸可待因錠	30 毫克/錠

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

便秘(最常見)、噁心、嘔吐、頭暈、鎮靜、嗜睡、幻覺、呼吸短促、視力模糊、睡眠困難、肌肉不受控制的震顫。