

Colchicine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Colchicine	Colchicine®	可樂喜定錠	0.5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療與預防痛風發作和痛風性關節炎。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑過敏者。

2. 嚴重肝、腎功能不全患者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加胃腸不適的副作用。

2. 服用本藥時，避免與葡萄柚汁一同服用。

3. 服用此藥品可能會引起骨髓抑制的副作用，建議長期使用的患者須定期檢查全血球數。

4. 服用此藥品可能會影響尿液檢查的結果，如需做尿液檢查的患者，請先告知您的醫師。

5. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心血管疾病、肝、腎、腸胃道方面疾病的患者，請告知您的醫師。

6. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方或非處方的用藥。

7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

8. 如需要長期服用本藥，請定期回診診察，讓醫師可以評估藥品的療效及避免副作用的發生。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏、皮膚紅疹、黑便、血便或血尿、不正常的出血、運動時呼吸困難、發燒、頭痛、異常虛弱。

腹瀉、噁心、嘔吐、腹部不適：若停藥 3 小時以上仍未改善則立即就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

肌肉無力、手指或腳趾麻木感、食慾減退、毛髮掉落。