

Buprenorphine/Naloxone SL 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Buprenorphine/ Naloxone	Desud [®] plus	解佳益舌下錠	B 8 毫克+ N 2 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 鴉片類物質成癮之替代療法。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 藥片必須放在舌頭下方，直到完全溶解。藥片完全溶解之前，不得吞咽、咀嚼食物或喝水。
3. 若所需劑量超過 2 錠，可一次放所有須服之藥量於舌下，或(無法一次口含 2 錠以上)一次放 2 錠，直到所有藥量用畢。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品任一成分過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若您正在服用 opioid 類止痛藥品，但不確定其他併服的藥品是否與其會產生藥物交互作用，應諮詢醫療人員。就醫時，亦應告知醫療人員所有正在服用的藥品(包含所有處方及非處方藥)。如仍有任何疑問，請諮詢醫療人員。
2. 服用本藥可能會發生呼吸抑制，呼吸功能受損的患者，如慢性阻塞性肺炎、肺心症，需小心使用。
3. 服用本藥可能會發生中樞神經抑制作用，尤其是與酒精、鎮靜安眠藥併用，因此服藥期間應避免飲酒，也應避免開車或操作危險性機械。
4. 服用本藥可能會造成姿位性低血壓，起身時應緩慢，注意跌倒。
5. 使用本藥品有引起肝功能異常之副作用，若有黃疸、眼睛或皮膚變黃、食慾不振、疲倦、噁心、嘔吐等反應時，請立即就醫。
6. 突然停藥可能會有戒斷症狀發生，應注意戒斷症狀(焦慮、失眠、頭痛、疼痛、噁心、嘔吐、多汗症等)。
7. 計畫生育、懷孕或哺乳婦、肝腎疾病、肺部疾病、腎上腺功能異常、排尿困難、攝護腺肥大、膽囊疾病、甲狀腺疾病、憂鬱症病史、腦部腫瘤病史、頭部創傷等疾病病史，請先告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏、肝功能異常(黃疸、眼睛或皮膚變黃、食慾不振、疲倦、噁心、嘔吐)、呼吸變慢或呼吸困難、意識改變、虛弱無力、癲癇。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

便秘、胃部不適、頭痛、失眠、戒斷症狀(顫抖、流鼻水、淚水過多、腹瀉、肌痛)。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/9 修訂】

BTC00EH22-02