

Acetazolamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acetazolamide	Acetazolamide [®]	乙醯氮胺片	250 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療青光眼。
2. 作為藥物或心衰竭引起的水腫及癲癇的輔助治療。
3. 預防或改善急性高山症。

◆ **用量與用法：**

- 1 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 嚴重肝、腎功能不全者。
2. 高氯性酸中毒患者。
3. 對本藥和其所含賦形劑、對磺胺類藥物過敏者。
4. 慢性非充血性閉角型青光眼
5. 低鉀血症或低鈉血症

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

- 1 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 服用本藥請勿與酒精成分的飲料一起服用，可能會增加藥物的嗜睡及鎮靜的副作用。
3. 服用本藥應與大量開水一起服用，以預防腎結石產生。
4. 本藥為利尿劑，服用藥物後會增加排尿次數，為避免影響睡眠品質，除非醫師有特別指示，請於晚上 6 點前服用。
5. 服用本藥可能會增加眼睛或皮膚對光的敏感性，容易曬傷，應盡量避免不必要或長時間的日曬，且應注意防曬，可戴太陽眼鏡、穿防護衣物、或擦防曬品。
6. 請定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並確保藥物療效及用藥安全。
7. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、心血管疾病、肝、腎功能不良、肺氣腫或慢性肺部疾病、糖尿病、痛風或腎上腺機能不足等疾病病史，請告知您的醫師。
8. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。若使用本藥治療癲癇發作，請不要突然停藥。在完全停止服藥之前，請遵從醫囑，慢慢減量。
9. 您可能需要吃或喝含鉀的食物，例如柑橘汁，橙子或香蕉，以防止服用本藥時鉀的流失—請諮詢醫生。
10. 本藥可能會增加血糖或尿糖，而使糖尿病惡化，應監測血糖。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/2 修訂】

BTC00E101-02

Acetazolamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acetazolamide	Acetazolamide [®]	乙醯氮胺片	250 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏。心律不整。呼吸困難。皮疹，蕁麻疹或瘙癢。排尿疼痛。血便或尿液。皮膚或眼睛發黃。嚴重噁心或嘔吐。異常出血或瘀傷。關節或下背部疼痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

感覺異常、疲倦、味覺和嗅覺能力些許喪失、噁心或嘔吐、腹瀉、食慾降低、體重下降。