

Calcium carbonate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Calcium carbonate	Calcium carbonate®	碳酸鈣錠	500 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 為一種制酸劑：緩解胃部不適或灼熱感、經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。
2. 預防或治療鈣離子的缺乏症或高血磷症，如骨質疏鬆症、軟骨症、輕度至重度的腎功能不全患者、副甲狀腺低下患者、手腳抽搐患者。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 食物會增加鈣離子的體內吸收，服用本藥請飯後嚼碎吞服。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥和其所含賦形劑過敏者。
2. 血鈣過高患者。
3. 3 個月以下嬰兒禁用。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫(25°C)以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥應避免和酒精一起服用，否則會增加骨質疏鬆的風險。
2. 鈣離子會減少體內鐵離子的吸收，因此服用本藥品可多補充鐵質。
3. 服用本藥可能會發生血鈣過高的現象，其症狀為食慾不振、噁心、嘔吐、便秘。若血鈣嚴重過高，甚至可能會發生精神混亂、異常興奮的現象，此時應立即停藥就醫。
4. 本藥每日最大建議劑量之乳糖含量超過 5 克，對於牛奶或乳製品耐受度低者應小心服用。
5. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、腹瀉、胃腸道疾病患者、心臟疾病患者、體內電解質異常者、副甲狀腺功能異常者、腎功能異常或腎結石等其他病史等，請告知您的醫師。
6. 若正在服用抗癲癇藥(如 Dilantin® 癲能停膠囊)或抗生素(如 Tetracycline® 鹽酸四環黴素膠囊)等其他藥品應注意服藥時間，併服鈣離子製劑會使其他藥品的濃度下降，而使療效降低，因此在服用時，應和其他藥品間隔 1~3 小時以上。
7. 有正在服用毛地黃製劑 Digoxin 或其他類電解質等處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
8. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
精神混亂、異常興奮。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
胃痛、噁心、嘔吐、食慾不振、打嗝、口乾、便秘。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/27 修訂】