

Spironolactone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Spironolactone	Aldactin®	愛達信錠	25 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 利尿：可以將體內多餘的水和鹽份經尿中排出。
2. 治療高血壓、充血性衰竭、原發性醛類脂醇過多症、肝硬化或腎病導致水腫或腹水。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 如腸胃不適，可與食物和牛奶一起服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥及其所含賦形劑過敏者。
2. 無尿症病人、急性腎功能不全患者。
3. 血鉀過高的病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加藥品的副作用。
2. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
3. 本藥為利尿劑，服用藥物後會增加排尿次數，為避免影響睡眠品質，除非醫師有特別指示，請於晚上 6 點前服用。
4. 服用本藥可能會增加眼睛或皮膚對光的敏感性，容易曬傷，應盡量避免不必要或長時間的日曬，且應注意防曬，可戴太陽眼鏡、穿防護衣物、或擦防曬品。
5. 本藥可能會導致血中的鉀離子過高，應多注意且控制含鉀鹽食物(如代鹽)的攝取，可先請教醫師或營養師。
6. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心臟衰竭、肝、腎功能不良、糖尿病、經期不正常或痛風等其他病史，請告知您的醫師。
7. 若您正在服用 ACE inhibitor(如 Tritace® 心達舒錠等)、Lanoxin® 隆我心錠、Ligilin® 鋰齊寧膠囊等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
8. 請定期至醫院就診及檢查，以維持體內電解質的平衡及定期監測腎功能，以確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

痙攣、心跳脈搏不規律、精神錯亂、手腳唇刺痛或麻痺、呼吸短促或困難、異常疲勞。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、男性乳房腫脹、女性多毛症、月經不規則、嗜睡、口乾、異常發汗、便秘、性功能障礙。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00E112-02