

Trichlormethiazide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Trichlormethiazide	Fluitran [®]	服爾伊得安	2 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 利尿：可以將體內多餘的水和鹽份經尿中排出。
2. 治療高血壓：幫助血流順暢，降低血壓。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥、其所含賦形劑、sulfonamides 類藥品(如 Baktar[®]撲菌特錠等)過敏者。
2. 無尿症、急性腎衰竭患者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 本藥為利尿劑，服用藥物後會增加排尿次數，為避免影響睡眠品質，除非醫師有特別指示，請於晚上 6 點前服用。
2. 服用本藥會增加皮膚對光的敏感性，即使只是短時間，也有可能造成皮膚疹、發癢、紅或曬傷，因此要避免不必要或長時間的日曬並注意防曬。
3. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。同時應避免和含有酒精的飲料併服，因會增加上述的副作用。
4. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、心血管疾病、肝、腎功能不良、胰臟炎、糖尿病、痛風或紅斑性狼瘡等其他病史，請告知您的醫師。
5. 若您正在服用 ACE inhibitor(如 Tritace[®]心達舒錠等)、Lanoxin[®]隆我心錠、Ligilin[®]鋰齊寧膠囊或其他類利尿劑等處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
6. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
7. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
8. 請定期至醫院就診及檢查，以維持體內電解質的平衡及定期監測肝、腎功能，以確保藥物療效及用藥安全。
9. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

黑便、血尿或血便、心律不正常、神智改變、肌肉痙攣或疼痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、頭暈、疲倦、胃不適、噁心或嘔吐、由臥坐姿起立時會頭暈、無食慾、顏面潮紅、性功能障礙。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00EI13-02