

## Potassium gluconate solution (20mEq) 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Potassium gluconate solution (20mEq)	K-glu oral solution®	鉀補口服液	4680 毫克/15 毫升/瓶

- ◆ **用途：**（一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）  
鉀缺乏症。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
  2. 可與至少 100c.c.開水或果汁混合後服用，飯後服用。
  3. 應持續服用至鉀缺乏症獲得矯正。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
  2. 嚴重腎臟病。
  3. 腎上腺疾病(Addison 氏症)。
  4. 正服用滯留鉀離子利尿劑。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：儲存於 25°C 以下。
  2. 須置於孩童接觸不到之處。同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 服用本藥應時常回診檢測血中鉀離子濃度。以避免鉀離子濃度過高。
  2. 本藥不建議使用於孕婦及授乳婦。
  3. 在無醫療人員監測下，患有嚴重腎臟疾病之老年病人不可服用本藥。
  4. 使用任何其他藥物（包括處方藥，非處方藥，維生素和草藥產品）之前，請先諮詢您的醫師或藥師。
  5. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫  
過敏、意識混亂、血壓降低、心律不整。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
噁心、胃痙攣、嘔吐。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/8/10 修訂】

BTC00EI14-02