

Febuxostat 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Febuxostat	Feburic®	福避痛膜衣錠	80 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於治療慢性痛風病人的高尿酸血症。
2. 不建議用於無症狀的高尿酸血症者。

◆ **用量與用法：**

1. 建議劑量為每日服用半錠至一錠。
2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 曾對本藥主成分或賦形劑過敏者。
2. 正在使用 azathioprine 或 mercaptopurine 的病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 請將藥品存放至孩童拿不到的地方。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品可能發生罕見但嚴重之皮膚過敏反應，如用藥後發生喉痛、嘴巴破、眼睛癢，皮膚紅疹等，應立即停藥並回診。
2. 如有疲勞、食慾不振或尿液顏色變深，請立即停藥就醫。
3. 剛開始服用本品由於血清尿酸濃度改變導致尿酸鹽從組織沉積移轉，痛風可能會發作，必要時可用非類固醇骯發炎藥或秋水仙素預防痛風發作。
4. 懷孕及哺乳期間須經由醫師評估過後才能使用。
5. 肝、腎功能不全請小心使用。
6. 服藥期間請注意高血鉀或鹼中毒症狀，如無精打采、神智昏眩、不安、心率不整。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

喉痛、嘴巴破、眼睛癢，皮膚紅疹等過敏反應；疲勞、食慾不振或尿液顏色變深。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

肝臟酵素異常、噁心、關節痛。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2020/9/2 修訂】

BTC00E116-02