

Alginate acid 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Alginate acid	Algitab®	艾胃逆服咀嚼錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**

1. 本藥品具有中和胃酸和抗潰瘍作用，適用於逆流性食道炎、胃灼熱、胃酸過多、胃及十二指腸潰瘍。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 餐後或睡前於口中咀嚼或溶化後吞服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25 度 C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 有腎臟病或對鹽類攝取有限制的病人(需限鈉者，每錠含鈉 0.4mEq)需謹慎使用。
2. 未經醫師指示，三歲以下幼兒不得服用。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、肝、腎疾病、消化性潰瘍、腎衰竭，請告知醫師。
4. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。
5. 無法忍受本藥品味道的患者，可和水、牛奶或食物一起服用。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏，發生任何不適，連續服用本藥數日後症狀未改善。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
腹脹、打嗝、腹瀉或便秘、噁心或嘔吐。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/2 修訂】

BTC00EK02-02