

Bismuth subcarbonate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bismuth subcarbonate	Bismuth subcarbonate®	"榮民" 次碳酸鉍錠	324 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 可緩解胃酸過多、胃炎：可中和胃酸，減少胃酸對胃壁之刺激，抑制胃腸蠕動。
 2. 可緩解腹瀉、腸炎、潰瘍性腸炎。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次。
 2. 本藥不得長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非醫生或藥師指示，不得連續使用一星期以上。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥避免飲酒或飲用含有酒精成分的飲料。
 2. 若經數次服藥後病況未見好轉或發生便秘時，應回診請教醫師。
 3. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、有肝、腎臟疾病、胃潰瘍或十二指腸潰瘍、消化管壁曾經有受傷情形等病史，請告知您的醫師。
 4. 若您正在服用降血糖用藥、痛風用藥、抗生素(如 Tetracycline® 鹽酸四環黴素膠囊)等或其他處方和非處方的用藥，請告知您的醫師。
 5. 嚴重腹瀉，或有發燒症狀時，請儘速就醫。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫
嚴重且持續的腹瀉、嚴重虛弱、嚴重的噁心和嘔吐、肌肉痙攣(特別是臉部、頸部和背部)、視力和聽力方面的問題。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
便秘、噁心、嘔吐、大便顏色改變(可能會出現灰黑便，停藥後會消失)。