

Mosapride 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Mosapride citrate	Mopride®	摩舒胃清膜衣錠	5 毫克/錠

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。
- ◆ 用量與用法：
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
 1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
 2. 有腸穿孔、腸阻塞或腸出血病史者。
- ◆ 忘記服藥時該如何處理？
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ 藥品儲存：
 1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ 注意事項：
 1. 若與心臟節律藥物(如 Cordarone 臟得樂錠、Rytmonorm 心利正膜衣錠)一起服用，服藥期間應注意有無心律不整的情形發生。若有胸部不適情形，請回診就醫。
 2. 若服藥經過一段時間(通常是二星期)症狀未見好轉，請回診告知醫師。
 3. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、心臟衰竭、心律不整等心臟血管疾病、肝、腎疾病等病史或因嘔吐腹瀉造成的電解質不平衡，請告知您的醫師。
 4. 若有正在服用心臟血管用藥、利尿劑或其他的處方和非處方用藥，請告知您的醫師。
 5. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？
 1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫
肝指數上升、皮膚或眼睛顏色變黃、尿液顏色變深、口腔失去知覺(包括舌頭與嘴唇等)。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
腹瀉、腹痛、噁心嘔吐、倦怠感、頭暈、頭痛、口乾。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00EK15-02