

Ursodeoxycholic acid 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ursodeoxycholic acid	Genurso [®]	健膽舒錠	100 毫克/錠

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 用於促進膽囊膽固醇結石溶解。
 2. 治療全靜脈營養注射液(TPN)所引發的膽汁鬱滯。
- ◆ 用量與用法：
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
 1. 對本藥或其賦形劑、膽酸類藥物過敏者。
 2. 猛爆性肝炎患者。
 3. 膽道閉塞患者。
- ◆ 忘記服藥時該如何處理？
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ 藥品儲存：
 1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ 注意事項：
 1. 服用此藥後應定期至醫院就診和檢查肝功能，以作為醫師調整藥物的依據，並確定膽結石是否溶解，以確保藥物療效及用藥安全。因為此藥品的藥效較慢，可能需要幾個月的時間才能將膽結石完全溶解。
 2. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、肝臟疾病病史、嚴重肥胖疾患、消化管潰瘍、膽管結石等病史，請告知您的醫師。
 3. 若您正在服用口服降血糖藥、降血脂藥、口服避孕藥或其他處方和非處方的用藥，請告知您的醫師。
 4. 不可和含鋁的制酸劑一起服用，如 Ulcerin P[®] 爾胃適寧-普錠、Peichia[®] 培佳治錠等。
 5. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
胃痛、右上腹部嚴重疼痛、嚴重的噁心與嘔吐、血尿或濁尿。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
便秘或腹瀉、消化不良、脹氣、胃部不適、搔癢、疲倦、目眩、金屬味覺、關節或肌肉疼痛、排尿困難。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00EK22-02