

Tenofovir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tenofovir disoproxil fumarate	Viread®	惠立妥膜衣錠	300 毫克/錠
Tenofovir alafenamide	Vemlidy®	韋立得	25 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療 B 型肝炎。

◆ 用量與用法：

1. 建議每天一次、固定的時間服用，隨餐使用。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥品成分過敏

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存於室溫 30°C 以下，避光儲存。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用

◆ 注意事項：

1. 治療期間內按時回診，以利監測療效與肝、腎功能；如肝炎症狀惡化請立即回診就醫。

2. 若曾有藥物過敏、計畫懷孕或懷孕及授乳、正服用其他藥品或是服藥後有任何不適的情況請務必告知醫師來加以評估，決定是否使用。

3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行變更藥量、使用天數或突然停藥；如果停藥，請告知醫師，中斷抗 B 型肝炎治療可能會導致隨後的肝炎急性惡化，在中斷治療後數個月應密切監測肝功能。

4. 服用抗病毒藥物並不能避免病毒的傳染，請您採取相關安全防護措施，以避免傳染他人。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏症狀如皮膚疹、呼吸困難；肝炎症狀惡化。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

脹氣、噁心、嘔吐、無力。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2019/06/06 修訂】

BTC00EK26-02