

### Tranexamic acid 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tranexamic acid	Transamin <sup>®</sup>	斷血炎膠囊	250 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療全身及局部出血或出血性疾病，如牙科手術或其他手術後的出血。
2. 也可用於手術前，預防容易出血的病人術後嚴重出血的機會。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次或使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
2. 天生對顏色分辨能力不健全患者。
3. 腦內蜘蛛膜下出血。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 長期服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
2. 避免從事危險或易受傷的工作或運動。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女，有心、肝、腎功能不全、血栓之患者(如腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎等)及可能引起血栓之患者、血尿、色盲等其他病史，請告知您的醫師。
4. 請告知您的醫師您現在服用的所有藥品，包含中藥、處方或非處方的用藥。
5. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
嚴重或突然性的頭痛、突然失去方向感、胸口痛、腿痛(特別是小腿)、呼吸短促、突然性的說話模糊不清、突然視力改變、手臂或腿虛弱或麻、異常虛弱或疲倦。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
腹瀉、噁心或嘔吐、異常經痛、流眼淚、皮膚紅疹或癢。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2017/5/9 修訂】

BTC00EL06-02