

Acarbose 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acarbose	Acarose®	降糖佳	50 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療第二型糖尿病。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 本藥可以剝半、磨粉或管灌。

3. 本藥必須在用餐前，以少量液體，整顆吞服，或用餐時與前數口食物一起咬碎吞下。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑成分過敏者、嚴重腎功能不全者、慢性腸胃道不適，伴隨明顯消化、吸收障礙者。

2. 服用本劑，腸內氣體增多，而惡化 Roemheld's 症、重度疝氣、腸阻塞、腸潰瘍者病情。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 若您還在進餐或剛吃完飯時想起，請立即服用。若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用 2 倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 開始用藥的前 6-12 個月請適時接受肝功能檢查。

2. 請遵醫囑控制飲食和飲酒量，定期檢查血糖數值及規律的運動。

3. 降糖佳具有降血糖的作用但本身不會導致低血糖症，若與其他糖尿病治療藥物合併使用則會增加低血糖症的發生率。

4. 如果急性低血糖症發生時，必須留意到服用糖祿錠會使蔗糖分解成果糖及葡萄糖的速度更緩慢，因此使用蔗糖並不適用於解除低血糖症，必須使用葡萄糖。請隨身備有葡萄糖水或其他含糖的食物，預防低血糖。

5. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、腎臟疾病、腸胃道疾病或同時服用其他藥物。

6. 請隨身備有葡萄糖水或其他含糖的食物，預防低血糖。

7. 部分中草藥或健康食品可能會影響血糖值，有需服用此類食品請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
嚴重低血糖昏迷。	立即送急診
低血糖症狀(虛弱、昏睡、昏亂、冒冷汗、顫抖、心悸、視力模糊、頭痛、飢餓)。	立即吃含糖食物或飲料(糖果或果汁等)，若症狀未改善，則立即送急診
過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口	請停藥，並立即就醫

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/6 修訂】

BTC00EM07-02

Acarbose 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acarbose	Acarose®	降糖佳	50 毫克/錠

腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難)。	
胃部脹氣、噁心、嘔吐、腸胃及腹部疼痛、腹瀉、消化不良。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師



無私奉獻・誠懇服務

En Chu Kong Hospital

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/6 修訂】

BTC00EM07-02