

Ethinylestradiol/Cyproterone acetate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ethinylestradiol + Cyproterone acetate	Diane-35®	黛麗安糖衣錠®	E 0.035 毫克+ C 2 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 抑制雄激素的作用，可用於治療痤瘡、皮脂溢出、多毛症。
2. 口服避孕藥。

◆ 用量與用法：

1. 一片錠劑有 21 顆，每天一次，每次 1 粒，連續 21 天，休息 7 天之後再開始服用第二片。
2. 通常於月經週期的第一天開始服用，也可以在第 2~5 天開始服用。
3. 懷孕 3 個月內流產者可立即開始服用；產後或懷孕 3~6 個月流產者，建議從產後第 21-28 天開始服用。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥品過敏者。
2. 懷孕婦女、哺乳婦女。
3. 有過血栓靜脈炎或靜脈栓塞症的患者。
4. 嚴重肝功能不全患者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 開始用藥的第 1-2 週忘記服藥：
想起時盡快補服 1 錠，即使可能同時服用 2 錠；若連續 2 天忘記服藥，則在接下來的 2 天都服用 2 錠(並在接下來的 7 天採取額外避孕措施)，之後回復每天 1 錠。
2. 開始用藥的第 3 週忘記服藥：
 - ① 想起時盡快補服 1 錠，即使可能同時服用 2 錠。之後每天服用 1 錠。並且在服用完目前的一包後立即服用下一包，即兩包之間沒有間隔。
 - ② 直接停藥 7 天(含忘記服藥的那天)，再開始下一包。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 抽菸會使增加本藥品的心臟血管副作用，因此服用本藥時，盡可能減少抽菸的次數。
2. 罹患高三酸甘油血症或有家族史婦女，服用本藥可能會增加胰臟炎的危險性。
3. 本藥可能會使血壓略為增高，但通常不具臨床意義，若血壓罕見的持續增高，請立即就醫。
4. 有心臟血管、肝、腎疾病、血栓、有腫瘤的患者(如：乳癌)、糖尿病、骨質疏鬆、精神方面疾病、偏頭痛、高血脂、癲癇、氣喘等方面的患者，請告知您的醫師和您現在服用的藥品。
5. 停藥 2~3 天後會有類似月經的輕微出血，持續 2~4 天，為正常現象。除非醫師停止處方，在停用 7 天後，無論是否還有沒有出血，應開始在服用下一盒黛麗安糖衣錠。
6. 本藥每錠含 31 毫克乳糖，乳糖不耐症等無法服用乳糖的病人應考量本藥的乳糖含量。

Ethinylestradiol/Cyproterone acetate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ethinylestradiol + Cyproterone acetate	Diane-35®	黛麗安糖衣錠®	E 0.035 毫克+ C 2 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重頭痛、偏頭痛、視力、協調性改變或喪失、手腳麻木或疼痛、不明之呼吸急促、眼睛和皮膚變黃、持續陰道不正常出血或月經變化、嚴重抑鬱等。如察覺有血栓徵兆(腿部異常疼痛或腫脹、胸悶胸痛等)，應立即停藥就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

噁心、嘔吐、脹氣、下腹部疼痛、陰道異常出血、經期異常、頭痛、性慾和體重改變、乳房脹痛或有分泌物、皮膚紅腫、癢、虛弱無力等