

### Ritodrine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ritodrine	Anpo®	安寶錠	10 毫克/錠

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
  1. 為子宮鬆弛劑，可抑制子宮收縮的頻率與強度，可預防早產、流產。
- ◆ 用量與用法：
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
  1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
  2. 陰道大量出血。
  3. 絨毛羊膜炎。
- ◆ 忘記服藥時該如何處理？
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ 藥品儲存：
  1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ 注意事項：
  1. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
  2. 若已懷孕(不建議在懷孕的前 20 星期使用)、計畫懷孕、要哺乳的婦女，肝、腎功能不全、有心臟血管疾病、高血壓、甲狀腺機能亢進、偏頭痛、或糖尿病等其他病史，請告知您的醫師。
  3. 若有正在服用  $\beta$ -blockers 類的降血壓藥物(如 Propranolol® 心律錠等)、類固醇、氣喘用藥等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
  4. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
胸痛、呼吸困難、呼吸短促。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
視力模糊、嗜睡、口乾、皮膚潮紅、出汗、顫抖、噁心、嘔吐、頻尿。